


JAあさひかわ特別栽培米部会 令和1年度 栽培基準

●農薬の使用基準

用途	毒性	農薬名	10a当り使用量・使用濃度 (散布水量100l当り使用薬剤量)	使用時期	使用方法	使用回数 (以内)	成分数	有効成分名	備考
殺虫剤	普	パディート箱粒剤	中苗50g/箱、成苗30g/箱	は種時覆土前～移植当日	所定の量を育苗箱の上から均一に散布	1	1	シアントラニリプロール	ドロオイムシに対して高い防除効果があります。
殺虫剤	普	バズ顆粒水和剤	1,000～2,000倍液を1箱当り500mLかん注	は種時覆土前～移植当日	育苗箱当り希釈液0.5ℓを苗の上から散布	1	1	シアントラニリプロール	ドロオイムシに対して高い防除効果があります。1000倍推奨
除草剤	普	アップレZフロアブル	500ml/10a	移植後3日～ノビエ3葉期まで ただし、移植後30日まで	湛水散布	1	3	ピラクロニル・フロピリスルフロン・プロモブチド	
殺虫剤・殺菌剤	普	ワイドパンチ豆粒	250g/10a	出穂期 収穫前35日前	湛水散布（7日止水）出穂期	1	2	エチプロール・メトミノストロピン	ヘリ散布・散布機使用・手散布

●減化学肥料栽培の施肥（要素量の50%を有機にて代替）



使用農薬

区分	殺虫剤(箱施用)	殺虫剤(灌注処理)	除草剤	殺虫・殺菌剤
薬剤名	銘柄 パディート 箱粒剤	OR バズ 顆粒水和剤	銘柄 アップレZ剤 フロアブル・粒剤・ジャンボ	銘柄 ワイドパンチ豆粒
農薬成分カウント	1		3	2

側条肥料	全層肥料
銘柄 側条用 884	銘柄 フジミ発酵鶏糞 ペレット3号A